

TABELLA RIASSUNTIVA DEI NUOVI FARMACI IMPIEGATI IN PNEUMOLOGIA

I dati riportati in tabella sono solo indicativi e non esimono dal prendere visione, prima dell'uso dei farmaci, dei dati ufficialmente presenti nel foglietto illustrativo contenuto nella confezione. Non autorizzano, inoltre, il paziente all'auto-prescrizione dei prodotti.

PRINCIPIO ATTIVO	CLASSE	DOSAGGIO	INDICAZIONI E POSOLOGIA	NOTE
Ciclesonide	ICS	Bombolette pressurizzate da: 80 mcg per puff predosato 160 mcg per puff predosato	ASMA Fase acuta: da 160 mcg/sera, fino a 640 mcg al dì in 2 diverse somministrazioni da 320 mcg per 2 volte al dì in caso di asma grave Mantenimento: anche solo 80 mcg/sera	Somministrabile solo dai 12 anni di età in su Non è necessario agitare la bomboletta prima dell'uso Preferibile l'impiego di un distanziatore
Fluticasone Furoato/ vilanterolo	ICS-LABA	Dispenser a polvere secca da: 92/22 mcg 184/22 mcg	ASMA 92/22 mcg, 1 sola inalazione al mattino o 184/22 mcg, 1 sola inalazione al mattino in caso di asma non controllato con il precedente dosaggio BPCO 92/22 mcg, 1 sola inalazione al mattino.	Somministrabile solo dai 18 anni di età in su Non indicato nella crisi d'asma acuta
Olodaterolo	LABA	Dispenser per nebulizzato ultrafine: 2,5 mcg / per puff predosato	BPCO 2 inalazioni (puff) da 2,5 mcg in unica somministrazione al mattino	
Tiotropio	LAMA	Dispenser per capsule a polvere secca (per uso inalatorio): 10 mcg rilasciati Dispenser per nebulizzato ultrafine: 2,5 mcg / per puff predosato	BPCO 1 capsula di polvere (uso inalatorio) al mattino 2 inalazioni (puff) da 2,5 mcg in unica somministrazione al mattino (dose totale di 5 mcg)	Prestare attenzione in caso di pazienti con glaucoma e ipertrofia della prostata. Le capsule non devono essere ingerite
Formoterolo	LABA	Bomboletta di soluzione pressurizzata da 12 mcg per puff predosato Erogatore per capsule a polvere secca (per uso inalatorio) contenenti 12 mcg di farmaco per capsula	ASMA e BPCO 1-2 inalazioni (puff da 12 mcg per inalazione) mattino e sera. Mantenimento con 1 puff mattino e sera 1-2 capsula di polvere da 12 mcg per capsula (uso inalatorio) mattino e sera. Mantenimento con 1 capsula (uso inalatorio) mattino e sera Possibile una somministrazione aggiuntiva di 12-24 mcg al bisogno durante la giornata (in totale non si deve mai superare comunque il dosaggio di 48 mcg nelle 24 ore)	Somministrabile solo dai 6 anni di età in su Non si deve mai superare il dosaggio di 48 mcg nelle 24 ore
Beclometasone/ formoterolo	ICS-LABA	Bomboletta di soluzione pressurizzata da 100 mcg di beclometasone ultrafine + formoterolo 6 mcg per puff predosato Erogatore a polvere secca (per uso inalatorio) contenenti 100 mcg di beclometasone ultrafine + formoterolo 6 mcg	ASMA e BPCO 1-2 inalazioni (puff da 100 mcg/6 mcg) mattino e sera. Mantenimento con 1 puff mattino e sera 1-2 inalazioni (100 mcg/6 mcg di polvere secca per inalazione) mattino e sera. Mantenimento con 1 inalazione mattino e sera	Somministrabile solo dai 18 anni di età in su Non si deve mai superare la dose di 4 puff predosati o di 4 inalazioni di polvere nelle 24 ore
Budesonide/formoterolo	ICS-LABA	Dispenser inalatore di polvere secca da 160 mcg/4,5 mcg e 320 mcg/9 mcg	ASMA e BPCO Variabile da un minimo di 1 sola inalazione da 160/4,5 mcg al mattino, fino ad un massimo di 320 mcg/9 mcg: 1-2 inalazioni mattino e sera.	
Indacaterolo	LABA	Dispenser per capsule a polvere secca (per uso inalatorio) da 150 mcg e 300 mcg	BPCO 1 capsula di polvere (uso inalatorio) al mattino da 150 mcg o 300 mcg a giudizio del medico	Somministrabile solo dai 18 anni di età in su Le capsule non devono essere ingerite
Glicopirronio	LAMA	Dispenser per capsule a polvere secca (per uso inalatorio) da 44 mcg	BPCO 1 capsula di polvere da 44 mcg (uso inalatorio) al mattino	Somministrabile solo dai 75 anni di età in su Prestare attenzione in caso di pazienti con glaucoma e ipertrofia della prostata. Le capsule non devono essere ingerite
Indacaterolo/ glicopirronio	LABA + LAMA	Dispenser per capsule a polvere secca (per uso inalatorio) da 110 mcg/50 mcg	BPCO 1 capsula di polvere da 110 mcg/50 mcg (uso inalatorio) al mattino	Prestare attenzione in caso di pazienti con glaucoma e ipertrofia della prostata. Le capsule non devono essere ingerite
Acilidinio	LAMA	Dispenser per capsule a polvere secca (per uso inalatorio) da 322 mcg	BPCO 1 capsula di polvere da 322 mcg (uso inalatorio) 2 volte al dì (mattino e sera)	Prestare attenzione in caso di pazienti con glaucoma e ipertrofia della prostata. Le capsule non devono essere ingerite