

CLASSIFICAZIONE GOLD DI GRAVITA' DELLA BPCO

STADIO	SINTOMI CRONICI	SPIROMETRIA	TERAPIA CONSIGLIATA
0 A RISCHIO	Tosse Catarro	Nella norma	Nessuna specifica
I LIEVE	Presenti o assenti	$FEV_1/FVC \leq 70\%$ $FEV_1 \geq 80\%$	Broncodilatatori a breve durata d'azione solo al bisogno
II MODERATA	Presenti o assenti	$FEV_1/FVC \leq 70\%$ $FEV_1 \geq 50\% \leq 80\%$	Uso regolare di uno o più broncodilatatori a lunga durata d'azione Broncodilatatori a breve durata d'azione al bisogno Riabilitazione per un minimo di 2 mesi
III GRAVE	Presenti o assenti	$FEV_1/FVC \leq 70\%$ $FEV_1 \geq 30\% \leq 50\%$	Uso regolare di uno o più broncodilatatori a lunga durata d'azione Broncodilatatori a breve durata d'azione al bisogno Corticosteroidi inalatori in caso di 3 o più episodi di riacutizzazione negli ultimi 3 anni Riabilitazione per un minimo di 2 mesi
IV MOLTO GRAVE	Presenti o assenti	$FEV_1/FVC \leq 70\%$ $FEV_1 \leq 30\%$ o $\leq 50\%$ con insufficienza respiratoria o scompenso cardiaco destro	Uso regolare di uno o più broncodilatatori a lunga durata d'azione Corticosteroidi inalatori in caso di 3 o più episodi di riacutizzazione negli ultimi 3 anni Riabilitazione per un minimo di 2 mesi Trattamento delle complicanze Ossigenoterapia (se insufficienza respiratoria) NIV se è presente ipercapnia Valutare soluzione chirurgica (enfisema)